



HOSPITAL MATERNO-INFANTIL ANTONINHO DA ROCHA

PNEUMOCÓCICA CONJUGADA 13 valente

(PREVENAR) oferece proteção contra os 13 sorotipos mais prevalentes causadores das doenças pneumocócicas, incluindo o sorotipo (tipo da bactéria) 19A, uma grave ameaça para a saúde pública. Indicada a partir dos **02 meses de vida**. **04 doses** (2-4-6-12 a 15 meses). Quando a aplicação dessa vacina não tiver sido iniciada aos 02 meses de vida, o esquema de sua administração varia conforme a idade em que a vacinação for iniciada: **entre 07 e 11 meses de idade: 03 doses** (1ª dose na data escolhida, 2ª dose com intervalo de 02 meses, e terceira dose de 12 a 15 meses de idade. - **entre 12 e 23 meses de idade: 02 doses** com intervalo de dois meses, a partir do segundo ano de vida: dose única.

PNEUMO 23 - Ela é indicada como agente imunizante contra infecções pneumocócicas causadas por qualquer dos 23 sorotipos de *Streptococcus pneumoniae* incluídos na vacina, os quais são responsáveis por cerca de 80 a 90% das doenças pneumocócicas graves, como pneumonia, meningite e bacteremia/septicemia. É recomendada para crianças **acima de 02 anos de idade e adultos**. **A revacinação não é necessária ser administrada pelo menos antes de 05 anos podendo chegar a até 10 anos o seu efeito, exceto para pessoas expostas ao risco ou sob tratamento imunossupressivo.**

PENTAVALENTE (PENTA) - vacina combinada com cinco componentes - vacinas tríplice bacteriana acelular (difteria, tétano, coqueluche), contra infecções por hemófilus do tipo B e contra poliomielite (com vírus inativados) - deve ser adotada, sempre que possível, **quando não se pretende incluir na administração a vacina contra a hepatite B. (DTPa-IPV-Hib)**. Indicada a partir dos **02 meses de vida**. **04 doses** (2-4-6-18 meses).

(Quando já realizado a Hexa aos 2 meses, aplicar somente a dose dos 4 meses).

HEXAVALENTE (HEXA) - vacina combinada com seis componentes: contra hepatite B, tríplice bacteriana acelular (difteria, tétano, coqueluche), contra infecção por hemófilus do tipo B e contra poliomielite (com vírus inativados). Seu uso deve ser adotado, por ser aplicada em apenas uma injeção e por ser capaz de induzir eventos adversos com menor frequência. **(DTPa-HB-IPV- Hib)**. **São indicadas 02 doses** (02-06 meses de vida) aos 04 meses de vida é necessário a aplicação da Pentavalente)

HEPATITE A (Adulto) – vacina contra a Hepatite A, com vírus inativado, doença transmitida por alimentos, água e fezes contaminadas. Indicada **a partir dos 19 anos de idade**, sem limite superior de idade. **Dois doses**. A primeira dose na data escolhida, a segunda dose de 06 a 12 meses após a primeira (dose reforço).

HEPATITE A (Pediátrico) – vacina contra a Hepatite A com vírus inativado, doença transmitida por alimentos, água e fezes contaminadas. Recomendada para crianças **de 01 a 18 anos de idade**. **Dois doses**. A primeira dose na data escolhida, a segunda dose de 06 a 12 meses após a primeira (dose reforço).

MENINGOCÓCICA C (conjugada) – vacina contra meningite meningocócica pelo sorogrupo C. **Recomendada para criança com mais de 02 meses, adolescentes e adultos**. Crianças com até 12 meses de vida Três doses – o intervalo entre a 1ª e a 2ª dose deve ser de no mínimo 02 meses, sendo realizada a 3ª dose (reforço) aos 12 meses de vida. **Crianças com mais de 12 meses, adolescente e adultos não vacinados anteriormente: dose única.**

HPV QUADRIVALENTE - vacina recombinante contra o papilomavírus humano (tipos 6,11,16 e 18), proteção contra as seguintes doenças : câncer de colo de útero, lesões do colo do útero anormais e pré-cancerosas, verrugas genitais, câncer da vagina e da vulva, infecção por HPV. O esquema é composto por 3 doses. É indicada **para mulheres de 09 a 55 anos de idade e deve ser administrada em três doses intramusculares (0-2-6 meses) de intervalo.**

CATAPORA – (Vacina de vírus vivo atenuado), doença altamente contagiosa, causada pelo vírus varicela zoster, da família herpes. Recomendada para **crianças a cima de nove meses de vida**. Sendo de **09 meses a 12 anos de idade: dose única**. De **13 anos e acima: 02 doses** com intervalo de 06 a 10 semanas.

ROTAVÍRUS PENTAVALENTE protege contra a gastroenterite (diarréia e vômito). A vacina age auxiliando o organismo a desenvolver as defesas naturais contra os 05 tipos mais comuns de rotavírus. Administrada via oral, em três doses. **03 Doses**. A primeira dose da vacina deve ser administrada de 06 a 12 semanas de idade; as doses subsequentes devem ser administradas com intervalo mínimo de 04 semanas entre cada dose. A última dose não poderá ultrapassar de 32 semanas de vida (02anos e 08 meses).